



蜂螫 預防與處理

蜂螫的反應



- 1 一般被蜂螫後的正常反應包括局部紅腫、麻癢、刺痛感。
- 2 如果對蜂毒發生過敏反應，其症狀從輕微的局部大紅疹、搔癢、全身蕁麻疹、焦躁不安、噁心、嘔吐、胸悶、暈眩、腹痛、腹瀉、呼吸困難、意識混亂、吞嚥困難、喉頭水腫、肺水腫、低血壓、意識喪失、休克都有可能。

預防蜂螫的方法

01

戴帽子、穿鞋子與淺色長袖衣物；避免穿著鮮豔衣服及噴灑香水、有香甜味化妝品。

02

食用過的果皮、飲料、食物，用垃圾袋包好。

03

巡邏蜂在身旁飛來飛去時，表示它已懷疑你是敵人，此時最好站立不動保持冷靜。

04

如遇蜂群追擊，可盡量利用自然物協助，例如躲入水池或鑽入矮樹叢。

05

若遭到蜂類攻擊，最好用白色衣物包住頭並順著風的方向跑。

蜂螫處理方法



- 1 用鑷子、刀片、信用卡刮去毒液囊和刺，不要用手擠壓以免擠進更多毒液。
- 2 用肥皂水或消毒水清洗傷口，並蓋上紗布。
- 3 用冷敷減少腫脹及疼痛。
- 4 將螫傷部位放低，必要時立即送醫(毒性及過敏反應)。